

# Cattleya labiata coerulea X loddigesi coerulea

Cattleya labiata coerulea




X

Cattleya loddigesi coerulea



Diagr. Climatique de Garanhuns (Brésil)



Production hybride : Famille : Orchidaceae, Sous-famille : Epidendroideae, Tribu : Epidendreae, Sous-tribu : Laeliinae

**Cattleya labiata** : Epiphyte ou litophyte en haut des grands arbres. Ce cattleya de taille moyenne, originaire du Nord-Est du Brésil (500-1000m) a été découvert en 1817 par William Swainson dans l'Etat de Pernambuco – longue saison sèche et très chaude faisant suite à 3 mois de pluie -. En forêts tropicales humides proches des côtes ou forêts buissonneuses tropicales caduques éloignées des côtes ou milieu savano-montagneux à végétation rabougrie du Nord-Est. Pseudobulbes unifoliés et compressés. Inflorescence recouverte de 2 grands bractées et portant de 2 à 5 grandes fleurs de 12 à 17cm. La variété coerulea apporte un rose très pâle satiné. Labelle ovale, légèrement trilobé. Lobes latéraux entourant la colonne. Grand lobe médian bien étalé, très crispé. Labelle pourpre-magenta bordé de rose pâle, gorge jaune et une tâche plus pourpre au centre, plus vers l'apex. Climat froid à tempéré froid. Soleil indirect légèrement ombré.

**Cattleya loddigesii** : Espèce épiphyte ou litophyte de taille moyenne (20 à 30cm), bifoliée, du Sud-Est du Brésil. Longue inflorescence qui porte 1 à 10 fleurs parfumées de 8 à 10cm, rose lilas pâle au labelle à gorge jaune. Labelle légèrement trilobé. Lobes latéraux incurvés au-dessus de la colonne.

**Facilité de culture** : Plante assez facile (basée sur espèce « labiata »).

**Floraison** : Floraison (en France) en automne-hiver.

**Luminosité** : Forte lumière toute l'année (20 à 40 000 lux). Orientation Est de préférence.

**Températures** : Serre tempérée (moyenne de 20°C le jour et 16°C la nuit). Supporte serre tempérée chaude.

**Arrosage** : Copieux en été et des conditions plus sèches et plus fraîches en hiver.

**Engrais** : dose normale (0,5g/L) tous les 15 jours avec NPK 10/10/10. Eviter en période de repos.

**Hygrométrie** : forte (70/80%) en phase de végétation. 50/60% en période floraison et repos.

**Ventilation** : Bonne toute l'année

**Contenant** : Pot

**Plaque** : Possible mais très contraignant.

**Rempotage** : tous les 1/2 ans, au printemps à l'apparition des nouvelles racines.

**Substrat** : classique très drainant avec écorce de pin moyenne à grosse et billes.

**Période de repos** : marqué après floraison, réduire les arrosages (ne pas laisser les pseudobulbes se rider et les racines pourrir) et légèrement la température.

**Division** : coupe du rhizome

**Sortie au jardin** : Oui sans soleil direct et attention aux gastéropodes !

**Soins** : Cochenilles, pucerons, escargots, infections fongiques

*Infos partielles empruntées à la littérature de Roger Bellone, Pascal Descourvières, Claudie Roguenant, Claude Surand, Guy Chiron et aux sites web internet. Les noms des Botanistes sont en abréviation.*