

Cymbidium erythraeum

Production Botanique (séparation pseudobulbe)



Sous-famille : Epidendroideae, Tribu : Cymbidieae, Sous-tribu : Cymbidiinae

Espèce : Botanique sympodiale

Facilité de culture : facile

Distribution géographique : Himalaya, Nord de l'Inde et Ouest de la Chine

Altitude : .1000 à 2800m

Végétation / Milieu : épiphyte ou lithophyte

Températures de culture : Tempérée à Tempérée froid (18/24°C jour et 10/16°C nuit) mini>1 à 2°C avec voile hivernal

Pseudobulbes : Pseudobulbes ovoïdes, vert pâle avec bractées desséchées, très serrés

Feuillage : uni, longues feuilles rubanées, linéaire, distiques, vert clair

Taille : 40/60cm

Inflorescence : Hampe érigée et retombante de 60/75cm avec maximum 15 fleurs

Floraison/durée : très florifère en fin automne et hiver / 3 à 6 semaines (la floraison est initiée en automne)

Fleurs : Taille de 7cm environ de diamètre

Couleur : blanc rouge et vert avec motifs rayures et points

Parfum : Léger et agréable

Hygrométrie : 50/60% en été, 40/50% en hiver

Ventilation : Très bonne aération toute l'année

Rempotage : En février/mai, à l'apparition des nouvelles racines, et seulement si la plante déborde du pot

Pot : Pot terre

Plaque : N/A

Substrat : Mélange très drainant et lourd, de granulométrie moyenne à grosse. 60% écorce de pin 20 + fibre de coco + sable + 30% tourbe. Compost typé orchidée jardinerie convient pour Cymbidium

Culture hydroponique : N/A **Culture hygroton** : N/A

Luminosité : Directe à Indirecte et ombragée, 15 000/25 000 lux

Arrosage : Eau non calcaire à température ambiante. Très généreux de fin printemps à fin été avec substrat humide. 1 à 2 fois/semaine le reste de l'année avec substrat sec entre arrosages.

Engrais : Engrais fréquent riche en azote durant la croissance en printemps/été (feuilles + racines + pousses des hampes). Engrais riche en potasse et phosphore pendant la floraison. NPK équilibré et espacé en dehors.

Période de repos : Non

Division : séparation des pseudobulbes

Sortie au jardin : Oui, hors été, plein soleil d'avril à mi-juin et de mi-septembre à octobre. Ombragée en été. Rentrer avant premières gelées