

Oncidium ornithorhynchum (Bec d'oiseau)



Espèce botanique.

Facilité de culture : Facile.

Distribution géographique : originaire des forêts humides des régions s'étendant du Mexique à la Colombie. (Très forte humidité)

Altitude : .500m à 1700m. **Végétation :** Croissance sympodiale, épiphyte.

Pseudobulbes : Sur un rhizome, les pseudobulbes sont ovoïdes aplatis et lisses surmontés de 2 feuilles.

Feuillage : vertes et lancéolées et unies, à nervure parallèle.

Taille : 40 à 60 cm. **Inflorescence :** environ une vingtaine de fleurs. **Floraison :** plante hermaphrodite, en automne/hiver, hampe florale en panicule très ramifiée. **Fleurs :** environ de 1,5 à 2 cm.

Couleur : les sépales et les pétales sont roses, le labelle a 3 lobes dégradés de rose et de blanc, le gynostème jaune orangé.

Parfum : Oui.

Températures de culture : tempérées à froides. **Rempotage :** tous les 2 à 3 ans. **Substrat :** Substrat grossier et aéré, écorces granulométrie de 15 ou 20.

Culture en hydroponique : Possible.

Luminosité : 1/2 ombre à lumière tamisée **Humidité :** importante. **Arrosage :** Eau non calcaire, arrosage régulier tout au long de l'année. **Engrais :** Au redémarrage des nouvelles pousses. **Période de repos :** Non, très peu ou pas.

Division : Division du rhizome avec un mini de 3 bulbes.