

RESTREPIA BRACHYPUS



Origine du nom : Latin brachypus/podis : à pied court.

Distribution géographique : Origine du Venezuela à la Bolivie. Elle est fréquente en Colombie et en Equateur, plus rare au Pérou et en Bolivie.

Altitude : de 1500 à 3000 m.

Taille :

- Plante : 10 à 20 cm de haut
- Fleur : 2 à 3 cm de long

Description de la plante

- Croissance sympodiale
- Épiphyte

Les ramicaules érigés sont entourées de membranes parcheminées et portent une seule feuille apicale ovale à elliptique, croissance en touffe sur rhizome. L'inflorescence porte une fleur dont les sépales forment le synsépale de 20 à 30 mm de long est strié. Le labelle fait 12 mm de long sur 2 à 3 de large. Il est dans le même ton que le synsépale, avec en général 3 stries. Il est légèrement verruqueux et porte une échancrure plus ou moins profonde à l'apex. Inflorescence : 4 à 6 cm porte 1 fleur max

Floraison : Période de floraison : Printemps / Automne / Hiver / . Floraison : Quelques jours

Couleur(s) : jaune pourpre. Motifs : rayures.

Parfum : Non

Températures de culture : tempérées - froides

Niveau lumineux : Ombre (< 10 000 lux)

Humidité : Elevée toute l'année. Les racines doivent être gardées humides toute l'année.

Arrosage : Eau de pluie.

Période de repos : non

Substrat : Ecorces fines & sphagnum ou sphaigne pure

Rempotage : Tous les 1 à 2 ans

Mode de division : Division de touffe, keikis, bouture de feuille